**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CÂMPUS DE JABOTICABAL**

**ULTRASSONOGRAFIA MODO B E ELASTOGRAFIA
ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DE
TECIDOS MATERNO FETAIS DURANTE A GESTAÇÃO EM
OVINOS**

**Priscila Del Aguila da Silva
Médica Veterinária**

2017

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CÂMPUS DE JABOTICABAL**

**ULTRASSONOGRAFIA MODO B E ELASTOGRAFIA
ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DE
TECIDOS MATERNO FETAIS DURANTE A GESTAÇÃO EM
OVINOS**

Priscila Del Aguila da Silva

Orientador: Prof. Dr. Marcus Antonio Rossi Feliciano

Coorientador: Prof. Dr. Wilter Ricardo Russiano Vicente

Coorientador: Dr. Ricardo Andres Ramirez Uscategui

**Dissertação apresentada à Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias – Unesp,
Câmpus de Jaboticabal, como parte das
exigências para a obtenção do título de
Mestre em Medicina Veterinária
(Reprodução Animal)**

2017

S586u Silva, Priscila Del Aguila da
Ultrassonografia modo b e elastografia acoustic radiation force
impulse (arfi) de tecidos materno fetais durante a gestação em ovinos /
Priscila Del Aguila da Silva. -- Jaboticabal, 2017
iv, 33 p. : il. ; 29 cm

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista,
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2017
Orientador: Marcus Antonio Rossi Feliciano
Banca examinadora: Felipe Farias Pereira da Câmara Barros ,
Eliandra Antonia Pires Buttler
Bibliografia

1. Santa Inês. 2. Avaliação gestacional. 3. Maturidade fetal. I.
Título. II. Jaboticabal-Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias.

CDU 619:618.1:636.3

Ficha catalográfica elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação –
Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação - UNESP, Câmpus de Jaboticabal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Câmpus de Jaboticabal

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA MODO B E ELASTOGRAFIA ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DE TECIDOS MATERNO FETAIS DURANTE A GESTAÇÃO EM OVINOS

AUTORA: PRISCILA DEL AGUILA DA SILVA

ORIENTADOR: MARCUS ANTÔNIO ROSSI FELICIANO

COORIENTADOR: WILTER RICARDO RUSSIANO VICENTE

COORIENTADOR: RICARDO ANDRES RAMIREZ USCATEGUI

Aprovada como parte das exigências para obtenção do Título de Mestra em **MEDICINA VETERINÁRIA**, área: **REPRODUÇÃO ANIMAL** pela Comissão Examinadora:

Prof. Dr. MARCUS ANTÔNIO ROSSI FELICIANO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Prof. Dr. FELIPE FARIAS PEREIRA DA CÂMARA BARROS
Departamento de Ciência Animal / UNIFRAN - Franca/SP

Doutora ELIANDRA ANTONIA PIRES BUTTLER
Médica Veterinária Autônoma / Jaboticabal / SP

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2017

DADOS CURRICULARES DO AUTOR

PRISCILA DEL AGUILA DA SILVA – filha de Marcos Rocha da Silva e Marizalda de Lima Del Aguila, nasceu em Rio Branco – Acre, no dia 1 de setembro de 1992. Em janeiro de 2015, formou-se como Médica Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará. Em março de 2015 ingressou na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, da Universidade Estadual Paulista - Unesp, campus de Jaboticabal, no Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária (Reprodução Animal), sob a orientação do Prof. Dr. Marcus Antônio Rossi Feliciano.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Deus, que guiou meus passos até aqui, que me concedeu inúmeras bênçãos, sempre iluminando meu caminho e sendo misericordioso, dando forças para seguir em frente e me oferecendo as melhores oportunidades.

À minha mãe Marizalda Del Aguila, razão pela qual me mantive firme ao longo dessa caminhada. Por todo o seu amor e dedicação incondicionais, pelo companheirismo, por me apoiar nos momentos mais difíceis e por me proporcionar tantas alegrias, colocando minha felicidade muitas vezes em primeiro lugar, muito obrigada. Essa conquista não seria possível sem a senhora, dedico esse trabalho à senhora.

Ao meu pai Marcos Rocha, que mesmo com a distância sempre buscou meios de se fazer presente. Por pavimentar meu caminho até a universidade, por ser um pai amoroso e incentivador da minha carreira, muito obrigada.

Ao Prof. Dr. Marcus Antônio Rossi Feliciano, por me conduzir na pós-graduação e ter me acolhido em seu grupo. Por toda a paciência, pelos ensinamentos e oportunidades, e por estender a mão sempre que precisei. Por ser um orientador presente e ajudar em todos os aspectos do meu trabalho, ensinando passo a passo, sempre com uma piada pronta e um prazo a ser cumprido.

Ao Dr. Ricardo Uscategui, por ajudar em absolutamente tudo que precisei, fornecendo orientações valiosas e auxiliando desde a conduta clínica a ser tomada com os animais à escrita da dissertação. Por ser um grande incentivador, ainda que de um jeito peculiar, e por me amparar nos momentos de dificuldade. Sua ajuda e dedicação foram essenciais.

Ao Prof. Dr. Wilter Ricardo Russiano Vicente, por ter me dado a oportunidade de ingressar no mestrado ao ter me aceitado, por ser um grande mentor e fonte de inspiração, sempre sendo capaz de passar serenidade e palavras de sabedoria.

Aos amigos paraenses, Ana Cláudia, Eduarda Moutinho, Elaine Santos, Paulo Henrique, Victor Santos e Vívian Tavares, que me acolheram e se tornaram uma verdadeira família e um porto seguro nessa nova cidade.

Às amigas Jessica Lopes, Bryza Costa, Dandara Alves, Laís Moreira, Máira Khoury e Thayna Novais, por me mostrarem o real valor das verdadeiras amizades e que estas não se perdem ao longo do tempo e apesar das distâncias.

À equipe da obstetrícia veterinária e reprodução (SORA), amigos que dispuseram de seu tempo, muitas vezes escasso, para que eu pudesse conduzir meu trabalho, ajudando sempre que necessário, especialmente Ana Paula Simões, Marjory Maronezi e Michelle Avante.

À 'equipe das ovelhas' Augusto Taira, Mariana Kako, Renata Sitta e Victor Santos. Conseguimos! Passamos por maus bocados juntos, quase moramos no aprisco, brigamos e fizemos as pazes diversas vezes, perdemos inúmeras noites de sono para ajudarmos uns aos outros. Olhando pra trás vejo que tudo valeu à pena. Vocês são muito especiais, esse trabalho é nosso, obrigada.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa concedida.

Aos ilustríssimos membros das bancas do exame geral de qualificação e defesa: Dra. Eliandra Pires Buttler, Prof. Dr. Joaquim Mansano Garcia e Prof. Dr. Felipe Farias Pereira da Câmara Barros pela disponibilidade, importantes correções, direcionamentos e sugestões.

SUMÁRIO

	Pag.
CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS.....	ii
RESUMO.....	iii
ABSTRACT	iv
CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	1
1. Introdução.....	1
2. Revisão de Literatura.....	2
2.1 Fisiologia da gestação em ovelhas.....	2
2.2 Desenvolvimento e maturidade fetal.....	3
2.2.1 Pulmão	3
2.2.2 Fígado	5
2.2.3 Rins	5
2.2.4 Placentônios	5
2.3 Ultrassonografia gestacional em ovelhas	6
2.4 Elastografia Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI)	8
3. Referências.....	12
CAPITULO 2 - ELASTOGRAFIA ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DE TECIDOS MATERNO-FETAIS EM OVINOS GESTANTES.....	17
Resumo	17
Introdução.....	18
Métodos.....	19
Resultados.....	21
Discussão	22
Conclusão.....	25
Agradecimentos.....	25
Referências.....	25

CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

CEUA – COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

CERTIFICADO

Certificamos que o projeto intitulado "**Ultrassonografia modo B e elastografia ARFI pulmonar, hepática e renal no desenvolvimento fetal de ovinos**", protocolo nº 10.387/16, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Marcus Antônio Rossi Feliciano, que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao Filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem), para fins de pesquisa científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008, no decreto 6.899, de 15 de junho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA), da FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS, UNESP - CÂMPUS DE JABOTICABAL-SP, em reunião ordinária de 06 de julho de 2016.

Vigência do Projeto	01/08/2016 a 31/10/2016
Espécie / Linhagem	Ovino / Santa Inês
Nº de animais	20 animais
Peso / Idade	2-4 anos / 45-60kg
Sexo	Fêmeas
Origem	Propriedade na região de São Carlos

Jaboticabal, 06 de julho de 2016.

Profª Drª Lizandra Amoroso
 Coordenadora – CEUA

ULTRASSONOGRAFIA MODO B E ELASTOGRAFIA ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) DE TECIDOS MATERNO FETAIS DURANTE A GESTAÇÃO EM OVINOS

RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar a rigidez de tecidos materno fetais em ovinos a partir da décima semana de gestação, por meio da elastografia ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse), determinando padrões qualitativos e quantitativos, com o intuito de verificar a aplicabilidade da técnica elastográfica no estudo do desenvolvimento desses tecidos. Foram avaliadas 24 ovelhas multíparas, com peso entre 40 e 60 quilos e idade entre 2 e 5 anos, da raça Santa Inês. Após a realização de exames prévios e verificada a higidez dos animais, estes foram submetidos a um protocolo de sincronização de estro seguido da monta natural. Quando confirmada a prenhez, foram submetidos aos exames ultrassonográfico convencional e elastografia (método ARFI quantitativo e qualitativo) do tecido pulmonar, hepático, renal e placentônios, com a utilização do aparelho ultrassonográfico ACUSON S2000/SIEMENS e softwares específicos. Os exames foram realizados semanalmente, a partir da décima semana gestacional (64 a 70 dias) até a semana da parição, sendo verificados os achados sonográficos destes tecidos, velocidade de cisalhamento (avaliação elastográfica quantitativa) e suas características de rigidez (avaliação elastográfica qualitativa). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e se utilizou nível de significância de 5% para todos os testes realizados. Os animais não apresentaram quaisquer alterações clínicas e obstétricas durante o período gestacional e parto. Os neonatos apresentaram-se saudáveis e normais. A elastografia ARFI foi realizada de forma consistente e sem qualquer dificuldade. A elastografia qualitativa de todos os tecidos não se apresentou deformável, demonstrando imagem homogênea. À avaliação quantitativa, as velocidades de cisalhamento pulmonar (95% CI = 0.70 a 0.62 m/s) e hepática (95% IC = 0,79 a 0,96 m/s) variaram ao longo das semanas gestacionais ($p < 0,001$), enquanto as velocidades renal (95% IC = 1,53 a 1,36 m/s) e do placentônio (95% IC = 2,34 a 2,28 m/s) não apresentaram diferença ($p = 0,076$ e $0,34$ respectivamente). A elastografia ARFI demonstrou ser uma técnica prática e segura para a avaliação do binômio materno-fetal, permitindo identificar os padrões de rigidez do placentônio, pulmão, fígado e rim fetais; apresentando correlação com o desenvolvimento gestacional das ovelhas por meio dos resultados da velocidade de cisalhamento dos tecidos pulmonares e hepáticos. Sugere-se que este método pode ser utilizado para estudos fisiológicos e patológicos na gestação de diversas espécies mamíferas.

Palavras-chave: Santa Inês, avaliação gestacional, maturidade fetal.

B-MODE ULTRASSONOGRAPHY AND ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE (ARFI) ELASTOGRAPHY OF MATERNAL-FETAL TISSUES DURING PREGNANCY IN OVINES

ABSTRACT – The aim of this study was to evaluate the stiffness of maternal fetal tissues of ovines from the tenth week of gestation, using elastography ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse), with the purpose of verifying the applicability of the elastographic technique in the study of the development of these tissues throughout the gestational period. Twenty - four multiparous ewes, weighing between 40 and 60 kilos and age between 2 and 5 years, of the Santa Inês breed were evaluated. After conducting preliminary exams and checked the healthiness of the animals, these were submitted to an estrus synchronization protocol and natural mating. When the pregnancy was confirmed, they were submitted to the conventional ultrasound examinations and elastography (quantitative and qualitative method ARFI) with the use of the ultrasound equipment ACUSON S2000 / SIEMENS and specific software. The exams were performed weekly, from the 10th gestational week (64 to 70 days) until the week of parturition and the shear wave velocity (quantitative elastographic evaluation) and stiffness characteristics were verified (Qualitative elastographic evaluation). The experimental lineation was completely randomized and used 5% significance level for all tests. The animals did not present any clinical and obstetric alterations during pregnancy and birth. The newborns presented themselves healthy and normal. ARFI elastography was performed consistently and without any difficulty. Qualitative elastography did not appear deformable, demonstrating homogeneous image. For quantitative evaluation, pulmonary (95% CI = 0.70 to 0.62 m/s) and hepatic (95% CI = 0.79 to 0.96 m/s) shear waves velocities varied over the gestational weeks ($P < 0.001$), whereas renal (95% CI = 1.53 a 1.36 m/s) and placentomes velocities (95% CI = 2.34 to 2.28 m/s) did not present difference ($p = 0.076$ and 0.34 respectively). ARFI-elastography has shown to be an applicable and safe technique for placentomes, pulmonary, renal and hepatic fetal tissues stiffness evaluation in ovine experimental model. Enabled qualitative and quantitative tissues elastographic characterization, and allowed to detect pulmonary and hepatic stiffness modifications related with fetal development and gestational age. We suggest that these results could be used as reference for pregnancy pathophysiological studies in ovine and extrapolated for gestational researches in other mammal species.

Keywords: Santa Inês, gestational evaluation, fetal maturation.

CAPÍTULO 1 – Considerações Gerais

1. Introdução

O diagnóstico intrauterino da maturação fetal e avaliação do desenvolvimento das estruturas materno-fetais são essenciais na tentativa de instituir meios para detecção de intercorrências durante a gestação nos animais, estabelecendo terapias pré-natais que aumentem as chances de sobrevivência fetal (CANELLO et al., 2015).

Dada a importância do acompanhamento gestacional, em medicina avalia-se a maturidade pulmonar de indivíduos via exames ultrassonográficos, por meio do estudo da ecotextura de tecidos fetais (PRAKASH et al., 2002) e diagnóstico de doenças pulmonares fetais (MOEGLIN et al., 2005). Especificamente em ovinos, devido à impossibilidade de palpação retal, a ultrassonografia fornece informações diagnósticas e de acompanhamento obstétrico importantes (OLIVEIRA et al., 2014).

Entre as novas técnicas ultrassonográficas, a elastografia começou a ser desenvolvida cerca de 20 anos atrás, apresentando como principal objetivo verificar a “dureza” tecidual, o que fornece uma informação adicional e clinicamente relevante na avaliação dos diferentes tecidos em humanos e animais (GENNISSON et al., 2013). Consiste em uma avaliação da elasticidade dos tecidos, permitindo uma espécie de “palpação virtual” (QUARELLO et al., 2016; FINK, 2013).

O uso da técnica elastográfica na avaliação tecidual de conceptos ovinos ainda não fora descrito em medicina veterinária. Neste contexto, surge a necessidade de se desenvolver estudos sobre reprodutibilidade, confiabilidade e qualidade efetiva dos resultados dessa técnica para avaliação gestacional dos animais de produção, avaliando metodologias de realização do exame e implementando o método na prática obstétrica em diversas espécies.

Espera-se que a avaliação elastográfica das estruturas materno-fetais de ovelhas gestantes possa contribuir para o estudo do desenvolvimento dos conceptos, avaliação da maturidade gestacional e predição de um momento ideal de parto para os animais. Especificamente, buscamos padronizar a técnica elastográfica qualitativa e quantitativa na avaliação do parênquima

pulmonar, hepático, rins fetais e placentônio de ovinos, determinando características de rigidez e valores de referência para velocidade de cisalhamento desses tecidos.

2. Revisão de Literatura

2.1 Fisiologia da gestação em ovelhas

A gestação consiste no processo fisiológico que se inicia na fecundação e se conduz até o momento do parto. O período médio de gestação da ovelha é de 150 dias, podendo sofrer variações de acordo com fatores nutricionais, manejo, sanitário, idade da mãe, número de fetos, raça, dentre outros (HAFEZ; HAFEZ, 2004).

Nos ovinos, o estabelecimento da prenhez se inicia com o estágio de blastocisto e inclui a sinalização do reconhecimento da gestação, implantação do concepto e placentação. O reconhecimento materno da prenhez é mediado pelo interferon T, secretado pelo concepto entre os dias 12 e 13 da gestação (TAVERNE; NOAKES, 2009). Para que se estabeleça e desenvolva uma gestação devem ocorrer uma série de mudanças endócrinas desencadeadas por interações ocorridas entre o concepto e útero materno (AISEN, 2008; FTHENAKIS et al., 2012).

Em pequenos ruminantes o corpo lúteo é mantido durante toda a gestação, entretanto, nas ovelhas a gestação é placenta-dependente, sendo esta a fonte de progesterona responsável pela manutenção do processo gestacional a partir da segunda metade da prenhez. A placenta atua no intercâmbio entre o feto e a mãe. Em ovelhas é do tipo cotiledonária e a junção dos cotilédones distribuídos no cório com as projeções do endométrio denominadas carúnculas, formando os placentônios. (AISEN, 2008; HYTTEL et al., 2012).

O mecanismo antiluteolítico do interferon T baseia-se na estabilização e aumento gradativo dos receptores de progesterona, inibição da síntese endometrial de receptores de estrógeno e ocitocina, o que leva a uma interrupção da liberação pulsátil de $PGF_{2\alpha}$. A implantação do embrião se dá pela adesão das células trofoblásticas mononucleares ao epitélio endometrial

do lúmen e fusão de células gigantes binucleadas com o epitélio luminal (SPENCER et al., 2004).

A vida pré-natal pode ser dividida em três períodos principais: período de fertilização, que acaba com o acoplamento inicial do embrião; embrionário: do 12º ao 34º dia, aproximadamente, quando ocorre o rápido crescimento e diferenciação com formação inicial da maioria dos órgãos e características do corpo; e período fetal, caracterizado pelo crescimento e maturação do feto (JAINUDEEN; HAFEZ, 2000).

O parto espontâneo em ovinos ocorre em torno de 150 dias (variação de 144-156), depois de um abrupto declínio na concentração de progesterona circulante. Anteriormente ao parto, ocorrem mudanças morfofisiológicas e de comportamento das fêmeas gestantes como relaxamento da parede abdominal e dilatação da vulva, além de serem percebidos inquietude e isolamento do animal. Estudos prévios demonstram que a ativação do eixo pituitário-adrenal do feto e consequente queda dos níveis de progesterona dão início ao trabalho de parto (CURRIE, 1934; FTHENAKIS et al., 2012). É demonstrado que nos animais domésticos há um brusco aumento do nível de cortisol e ACTH fetais coincidindo com o fim da gestação, sobretudo nas 48 horas que antecedem o parto (AISEN, 2008).

2.2 Desenvolvimento e maturidade fetal

O termo maturidade fetal é definido como um estado de completo desenvolvimento, perfeição e excelência, ou seja, um feto maduro é aquele que passou por um desenvolvimento tal que já se encontra apto a sobreviver fora do ambiente materno (CANELLO et al., 2015).

2.2.1 Pulmão

O desenvolvimento do aparelho respiratório fetal é um fenômeno complexo e contínuo, que engloba o crescimento e maturação pulmonar, sendo que a adaptação imediata à vida extrauterina depende diretamente da presença de uma função pulmonar adequada, correta maturação morfológica, fisiológica e bioquímica do parênquima pulmonar (CUELLO et al., 1993; KOPELMAN et al., 1998).

A ocorrência do desenvolvimento dos brônquios e dos pulmões pode ser didaticamente dividida em períodos: embrionário, fetal e pós-natal. Especificamente no período fetal, as ramificações brônquicas e estruturas alveolares preliminares são formadas. Este período pode ser subdividido em pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar (HYTTEL; SINOWATZ; VEJLSTED, 2012), onde ocorrem bifurcações do brônquio segmentar e origem dos bronquíolos terminais; formação de alvéolos primordiais decorrente de sucessivas bifurcações dos bronquíolos respiratórios; formação dos sáculos cegos; e formação definitiva dos alvéolos, respectivamente (DROZDOWSKA, 2016).

No período fetal, o lúmen do sistema respiratório é preenchido com fluídos resultante da secreção de glândulas em desenvolvimento e fluido amniótico aspirado nos movimentos respiratórios pré-natais e esses mecanismos combinados são determinantes no processo de crescimento pulmonar fetal (JOSHI; KOTECHA, 2007). Este líquido pulmonar é produzido principalmente por células epiteliais das vias aéreas distais e, especificamente em ovinos, são produzidos cerca de 2ml/kg/h na metade da gestação, chegando a 5ml/kg/h próximo da parição (KOTECHA, 2000).

A deficiência na maturidade fetal pode ser clinicamente caracterizada, entre outros fatores, pela insuficiência respiratória. Logo, é de grande importância que o grau de maturidade pulmonar fetal seja avaliado, considerando que qualquer defeito na formação de componentes pulmonares ou ainda em nascimentos prematuros, pode acarretar problemas respiratórios ao neonato, como a síndrome da angústia respiratória (SAR). Evitar o nascimento prematuro constitui a principal medida preventiva para reduzir os riscos e sequelas da morbidade respiratória neonatal (TABORDA et al., 1998).

Na medicina, a maturidade fetal pulmonar é avaliada pelo fluido amniótico utilizando amniocentese. Conforme o pulmão se desenvolve, quantidades significativas de surfactante são eliminadas dos pulmões do feto e se acumulam no líquido amniótico (FIELD & GILBERT, 1997). Basicamente, os testes de maturidade pulmonar dosam a presença do material surfactante no líquido amniótico ou testam a função surfactante presente nesse líquido (LUZ, 2001). A aplicabilidade de tais testes em veterinária ainda é recente, sendo na maioria das vezes utilizados em pesquisa.

2.2.2 Fígado

O fígado desenvolve-se a partir de brotos endodermiais que surgem na região mais caudal do intestino embrionário sendo regulado por uma série complexa de eventos de desenvolvimento, incluindo a especificação de células progenitoras (HYTTEL; SINOWATZ; VEJLSTED, 2012; NISSIM et al., 2016). Durante o processo gestacional, cresce rápido e expande-se ocupando a maior parte da cavidade abdominal. Apesar de este sistema sofrer diferenciação embriogênica precoce, muitas das funções metabólicas não são completamente desenvolvidas ao nascimento (GRUNDY, 2006; HYTTEL; SINOWATZ; VEJLSTED, 2012).

2.2.3 Rins

A nefrogênese inicia-se com três gerações sucessivas de primórdios renais: pronefro, mesonefro e metanefro. Os eventos importantes na vida fetal que precedem a aquisição da função renal incluem: indução de populações de células progenitoras que se diferenciarem em células específicas, o desenvolvimento e diferenciação de glomérulos e vascularização, diferenciação segmentar-específica dos túbulos renais e diferenciação terminal dos compartimentos celulares (LINTON et al., 2007).

A função renal fetal durante o período de gestação ocorre por meio de mudanças sucessivas, tanto fisiológicas como morfológicas. O conhecimento deste processo é importante uma vez que a urina, durante a última metade da gestação, é a principal fonte de líquido amniótico e, embora imaturo, o rim fetal, durante seu período de formação contribui para a sobrevivência do conceito durante seu crescimento (CANELLO et al., 2015).

2.2.4 Placentônios

A placenta dos mamíferos é um órgão transitório formado pela justaposição entre os tecidos maternos e fetais, sendo responsável pelas trocas fisiológicas e síntese de hormônios fundamentais para a manutenção da gestação. As células placentárias possuem propriedades metabólicas, endócrinas e angiogênicas específicas e são essenciais para o desenvolvimento adequado do conceito. Em ruminantes possui uma estrutura

macroscópica uniforme: os placentônios (CUNNINGHAM, 1999; HAFEZ; HAFEZ, 2004). Estas estruturas durante a gestação crescem e aumentam de tamanho (no início são planos e arredondados; com a progressão tomam forma anular com bordas proeminentes, com concavidade diretamente dirigida ao feto) (AISEN, 2008; HAFEZ; HAFEZ, 2004).

2.3 Ultrassonografia gestacional em ovelhas

O uso do exame ultrassonográfico em tempo real na reprodução animal representou um grande avanço no conhecimento científico dessa área. Na veterinária, o primeiro uso da ultrassonografia foi no diagnóstico gestacional de ovelhas, na década de 60. Especificamente em pequenos ruminantes, a difusão do exame ultrassonográfico torna-se mais relevante que de outras espécies de criação (como bovinos e equinos), em virtude da impossibilidade de palpação retal, possibilitando o diagnóstico obstétrico, detecção de prenhez e estudos científicos e aprimoramento do manejo e biotécnicas reprodutivas nas fêmeas ovinas (OLIVEIRA et al., 2014).

Para a detecção de prenhez em ovelhas, a ultrassonografia modo B é considerada um método seguro e de fácil aplicação, podendo ser utilizada via transretal a partir do 15º dia pós-cobertura, com a visualização de líquido no útero; e confirmação diagnóstica da gestação a partir do dia 21 pós-cobertura, quando é possível verificar a presença do embrião, caracterizado como uma estrutura hiperecoica localizada no interior da vesícula embrionária. Neste período inicial, já se pode ser verificada a presença dos batimentos cardíacos e placentônios (pequenas áreas ecogênicas na superfície do endométrio) (DESCÔTEAUX et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2014).

A avaliação ultrassonográfica gestacional via transretal (Figura 1A) é realizada com a utilização de transdutor linear com frequência de 7,5 MHz. Para tanto, o animal deve ser mantido em posição quadrupedal, podendo ter a parede abdominal comprimida para facilitar a visualização das estruturas uterinas. Após a aplicação de gel e introdução do transdutor no canal retal, este deve ser lentamente rotacionado em 'movimento de leque', para esquerda e direita (KÄHN, 1994).

A abordagem transabdominal (Figura 1B) é recomendada a partir dos 50 dias de gestação. Neste momento, a ultrassonografia transretal é prejudicada

pelo tamanho demasiado do feto, o que dificulta a avaliação e distinção de boa parte das estruturas materno fetais. O método transabdominal permite a identificação de uma maior porção do útero gravídico, podendo ser utilizada para monitoração da viabilidade gestacional ou ainda detecção de prenhez (KÄHN, 1994; DESCÔTEAUX et al., 2010).

Para o exame transabdominal, transdutores convexos e de frequências menores são preferidos (3,5 a 4,5 MHz). A tricotomia ampla de toda a região inguinal e abdominal deve ser realizada previamente. O exame pode ser realizado com o animal em estação, sentado ou ainda em decúbito, entretanto, observa-se que a posição em estação é eficiente e mais confortável para o animal. O transdutor deve ser posicionado na região inguinal direita, angulando-se em direção ao útero e promovendo a varredura completa em direção cranial. Para facilitar o posicionamento do examinador o animal pode ser colocado sobre uma superfície elevada (Figura 2) (FTHENAKIS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014).

Figura 1. Esquema do sistema reprodutor da fêmea ovina, com posicionamento dos transdutores pela abordagem A) transretal e B) transabdominal (KÄHN, 1994).

Em ovelhas gestantes, a ultrassonografia vem sendo utilizada para diagnóstico da gestação desde os anos 80 (WHITE et al., 1984). Sua aplicabilidade foi reiterada por Scott & Sargison (2010) que citam informações relevantes sobre a técnica como: precisão maior que 99% para diagnóstico de prenhez, mais de 98% de precisão na diferenciação entre fêmeas não prenhes, com gestação

simples ou gemelar, e determinação da quantidade de fetos de 97% foram alcançadas utilizando a ultrassonografia no acompanhamento gestacional.

Figura 2. Imagem fotográfica de exame elastográfico de ovelhas Santa Inês, com animal em estação e transdutor localizado em região inguinal.

De forma geral, o acompanhamento gestacional das ovelhas visa garantir o correto desenvolvimento da gestação e nascimento de animais saudáveis, com condições ótimas de desenvolvimento e peso (FTHENAKIS et al., 2012). O diagnóstico gestacional ultrassonográfico contribui para aumentar a eficiência reprodutiva dos animais, de modo a adequar precocemente o manejo às novas necessidades da fêmea gestante. Com o uso da ultrassonografia, é possível estimar a maturação fetal (nas diferentes fases do desenvolvimento do conceito) por meio da detecção do aparecimento de membros, encéfalo, calcificação e vísceras como o fígado, coração, rins, intestinos, estômago e vesícula urinária (AISSI et al., 2008; DAVIDSON & BAKER, 2009).

2.4 Elastografia Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI)

A elastografia é considerada um método diagnóstico promissor que permite a avaliação da elasticidade dos tecidos (DUDEA et al., 2011). Consiste em uma técnica de imagem, segura e não invasiva, que fornece medidas quantitativas e qualitativas da rigidez dos tecidos com uma variabilidade interobservador reduzida.

O software da elastografia ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) é diretamente integrado a um aparelho específico de ultrassonografia (Acuson S2000, Siemens AG, Erlangen, Alemanha) e a onda de cisalhamento é localizada, permitindo a seleção da área de interesse de mensuração pelo operador em modo B e em tempo real (CASSINOTTO et al., 2014). Essa onda de pressão se propaga e permite estimar a elasticidade tecidual e calcular a velocidade da onda de cisalhamento nos diferentes tecidos pelo deslocamento das ondas transversais (FRIEDRICH-RUST et al., 2009).

A magnitude do deslocamento é inversamente proporcional e a velocidade da onda de cisalhamento é diretamente proporcional à rigidez tecidual local. Um único transdutor é usado tanto para aplicar forças de radiação localizadas dentro do tecido por curtos períodos de tempo como para rastrear os deslocamentos de tecido resultantes. Os resultados são expressos em metros por segundo (m/s), esta velocidade de propagação da onda de cisalhamento é proporcional à raiz quadrada da elasticidade do tecido (GOERTZ et al., 2016).

Para avaliação qualitativa, este método utiliza impulsos acústicos curtos e de alta intensidade para deformar os elementos do tecido e criar um mapa estático (elastograma) de rigidez tecidual relativa. A avaliação elastográfica qualitativa (Figura 3A) fornece mapeamento em escala de cinza que demonstra a rigidez relativa dos tecidos da região estudada, comparando-se com a imagem ultrassonográfica convencional correspondente. De forma geral, as áreas mais claras representam os tecidos mais deformáveis do que as áreas escuras (GODDI et al., 2012).

O estudo quantitativo ARFI utiliza um impulso acústico primário em direção a uma região de interesse, promovendo a formação de ondas de pressão em propagação, capazes de deformar os tecidos, captando a velocidade de propagação das ondas de pressão (cisalhamento). A velocidade de propagação e a atenuação das ondas estão relacionadas com a rigidez e viscoelasticidade do tecido. O estudo quantitativo (Figura 3B) tem se mostrado promissor para a análise quantitativa da rigidez difusa de tecidos, diferenciação de lesões malignas e benignas, com base no estudo da rigidez absoluta e na monitorização da progressão de uma enfermidade (NIGHTINGALE, 2011; FELICIANO et al., 2014a).

Em veterinária, a ARFI é um método de imagem recente e tem sido usada na avaliação de neoplasias mamárias em cadelas (FELICIANO et al., 2014b), afecções testiculares em cães (FELICIANO et al., 2016). Também já foi utilizada para padronização de valores de referência na avaliação hepática, renal e esplênica em caninos adultos (HOLDSWORTH et al., 2014), baço de gatos adultos (FELICIANO et al., 2014c), baço de cães de diferentes idades (MARONEZI et al., 2015), próstata e testículos de cães (FELICIANO et al., 2015b), rim de gatos (GARCIA et al., 2015), testículo de gatos (BRITO et al., 2015) e no estudo do desenvolvimento do parênquima pulmonar e hepático de fetos caninos (SIMÕES, 2016).

Figura 3. Elastografia ARFI fetal de ovinos. A) Avaliação qualitativa (elastograma) de placentônio (pl). B) Avaliação quantitativa de placentônio (pl) com valores de velocidade de cisalhamento e profundidade.

Em estudo preliminar realizado por Peralta et al. (2015), utilizaram a técnica elastográfica (*Supersonic shear imaging*) para avaliar a rigidez do colo uterino de ovelhas gestantes (127 dias de gestação), visando acompanhar as modificações estruturais dessa porção após a indução do parto, com utilização de dexametasona. Estes autores verificaram uma diminuição da velocidade de cisalhamento nas primeiras 4 a 8 horas após aplicação do fármaco sugerindo que a elastografia pode complementar o diagnóstico de nascimentos prematuros em ovinos.

Em babuínos gestantes, Quarello et al. (2016) demonstraram a aplicabilidade e viabilidade da realização do método elastográfico (*Supersonic shear imaging*) na avaliação gestacional desta espécie, determinando características da rigidez dos tecidos placentários (QUARELLO et al., 2015a) e órgãos fetais como pulmão e cérebro (QUARELLO et al., 2015b). De acordo com estes autores, o desenvolvimento de estudos elastográficos em animais,

além de demonstrar a importância deste método no estudo da gestação dos babuínos, fornece valores relevantes para serem aplicados em humanos.

3. Referências

- AISEN, E.G. **Reprodução ovina e caprina**. 1ª. ed., MedVet, São Paulo, 2008. p.116-130.
- AISSI, A.; SLIMANI, S. Ultrasonographic appearance of gestational structures throughout pregnancy in bitches. **American Journal of Animal and Veterinary Sciences**, v. 3, n.1, p.32-35, 2008.
- BRITO, M. B. S.; FELICIANO, M. A. R., COUTINHO, L. N.; USCATEGUI, R. R.; SIMÕES, A. P. R.; MARONEZI, M. C.; ALMEIDA, V. T.; CRIVELARO, R. M.; GASSER, B.; PAVAN, L.; VICENTE, W. R. R. Doppler and Contrast-enhanced ultrasonography of testicles in adults domestic felines. **Reproduction in Domestic Animals**, v.50, n.5, p.730-734, 2015.
- CANELLO, F.G.; ALMEIDA, V.T.; KAWANAMI, A.E.; FERREIRA, G.S.; ORTOLAN, M.D.D.V.; OLIVEIRA, M.E.F.; FELICIANO, M.A.R.; VICENTE, W.R.R. Estudo da maturidade fetal canina em fase final de gestação: aplicabilidade diagnóstica. **Veterinaria e Zootecnia**, v.22, n.4, p.513-52, 2015.
- CASSINOTTO, C.; LAPUYADE, B.; MOURIES, A. HIRIART, J.; VERGNIOL, J.; GAYE, D.; CASTAIN, C.; LE BAIL, B.; CHERMAK, F.; FOUCHER, J.; LAURENT, F.; MONTAUDON, M.; DE LEDINGHEN, V. Non-invasive assessment of liver fibrosis with impulse elastography: Comparison of Supersonic Shear Imaging with ARFI and FibroScan. **Journal of Hepatology**, v.61, p.550–557, 2014.
- CUELLO, A.F.; AQUIM, E.E.; MASCIANTONIO, L. **Terapêutica funcional respiratória del recién nacido**. Buenos Aires: Intermédica, 1993.
- CUNNINGHAM, J.G. **Tratado de fisiologia veterinária**. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1999. 528p
- CURRIE, W. B. Regression of the corpus luteum of pregnancy and initiation of labour in goats. **Journal of reproduction and fertility**. v.36, p. 481-482, 1934.
- DAVIDSON, A.P.; BAKER, T.W. Reproductive ultrasound of the bitch and queen. **Topics in Companion Animal Medicine**, v.4, n.2, p.55- 63, 2009.
- DESCÔTEAUX, L.; GNEMMI, G.; COLLOTON, J. **Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography**. USA: Blackwell Publishing. 2010. p. 181-194.
- DROZDOWSKA, J.; COUSENS, C.; FINLAYSON, J.; COLLIE, D.; DAGLEISH, M.P. Structural Development, Cellular Differentiation and Proliferation of the Respiratory Epithelium in the Bovine Fetal Lung. **Journal of Comparative Pathology**, v.154, p.42-56, 2016.
- DUDEA, S.M.; GIURGIU, C.R.; DUMITRIU, D.; et al. Value of ultrasound elastography in the diagnosis and management of prostate carcinoma. **Medical Ultrasonography**, v.13, p.45-53, 2011.

FELICIANO, M. A. R.; MARONEZI, M. C.; SIMÕES, A. P. R.; MACIEL, G. S.; PAVAN, L.; GASSER, B.; SILVA P.; USCATEGUI, R. R.; CARVALHO, C.F.; CANOLA, J. C.; VICENTE, W. R. R. Acoustic radiation force impulse (ARFI) elastography of testicular disorders in dogs: preliminary results. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 68, n. 2, p. 283-291, 2016.

FELICIANO, M. A. R.; MARONEZI, M. C.; SIMÕES, A. P. R.; USCATEGUI R. R.; MACIEL, G. S.; CARVALHO, C. F.; CANOLA, J. C.; VICENTE, W. R. R. Acoustic radiation force impulse elastography of prostate and testes of healthy dogs: preliminary results. **Journal of Small Animal Practice**. v.56, n.5, p.320-324, 2015.

FELICIANO, M. A. R.; CARDILLI, D. J.; NEPOMUCENO, A. C.; CRIVELARO, R. M.; SILVA, M. A. M.; COUTINHO, M. E. F.; VICENTE, W. R. R. Echobiometrics kidney and renal artery triplex doppler of canine fetuses. **Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science**, v. 66, p. 445-449, 2014a.

FELICIANO, M. A. R.; MARONEZI, M. C.; PAVAN, L.; CASTANHEIRA, T. L.; SIMÕES, A. P. R.; CARVALHO, C. F.; CANOLA, J. C.; VICENTE, W. R. R. ARFI elastography as a complementary diagnostic method for mammary neoplasia in female dogs - preliminary results. **Journal of Small Animal Practice**, v. 55, n.10, p. 504-508, 2014b.

FELICIANO, M. A. R.; MARONEZI, M. C.; CRIVELLENTI, L. Z.; CRIVELLENTI, S. B.; SIMÕES A. P. R.; BRITO, M. B. S.; GARCIA, P. H. S.; VICENTE, W. R. R. Acoustic radiation force impulse (ARFI) elastography of the spleen in healthy adult cats – a preliminary study. **Journal of Small Animal Practice**, v.56, n.3, p.180-183, 2014c.

FIELD, N.T.; GILBERT, W.M. Current status of amniotic fluid tests of fetal maturity. **Clinical Obstetrics and Gynecology**, v.40, p.366–386, 1997.

FINK, M. Elastography: a new modality of ultrasound imaging. **Diagnostic and Interventional Imaging**, v.94, p.485, 2013.

FRIEDRICH-RUST, M.; WUNDER, K.; KRIENER, S.; SOTOUDEH, F.; RICHTER, S.; BOJUNGA, J.; HERRMANN, E.; POYNARD, T.; DIETRICH, C.F.; VERMEHREN, J.; ZEUZEM, S.; SARRAZIN, C. Liver fibrosis in viral hepatitis: noninvasive assessment with acoustic radiation force impulse imaging versus transient elastography. **Radiology**, v. 252, n. 2, p. 595-604, 2009.

FTHENAKIS, G.C.; ARSENOS, G.; BROZOS, C.; FRAGKOU, I. A.; GIADINIS, N. D.; GIANNENAS, I.; MAVROGIANNI, V. S.; PAPADOPOULOS, E.; VALASI, I. Health management of ewes during pregnancy. **Animal Reproduction Science**, v.130, p.198–212, 2012.

GARCIA, P. H. S.; FELICIANO, M. A. R.; CARVALHO, C. F.; CRIVELLENTI, L. Z.; MARONEZI, M. C.; ALMEIDA, V. T.; USCATEGUI, R. R.; VICENTE, W. R.

R. Acoustic radiation force impulse (ARFI) elastography of kidneys in healthy adult cats: preliminary results. **Journal of Small Animal Practice**, v.56, n.8, p.505-509, 2015.

GENNISSON, J.L.; DEFFIEUX, T.; FINK, M.; TANTER, M. Ultrasound elastography: Principles and techniques. **Diagnostic and Interventional Imaging**, v.94, p.487-495, 2013.

GODDI, A.; BONARDI, M.; ALESSI, S. Breast elastography: a literature review. **Journal of Ultrasound**, Heidelberg, v. 15, n. 3, p. 192-198, 2012.

GOERTZ, R.S.; SCHUDERER, J.; STROBEL, D.; PFEIFER, L.; NEURATH, M.F.; WILDNER, D. Acoustic radiation force impulse shear wave elastography (ARFI) of acute and chronic pancreatitis and pancreatic tumor. **European Journal of Radiology**, v.85, p.2211–2216, 2016.

GRUNDY, S. A. Clinically relevant physiology of the neonate. **Veterinary Clinics of North America**, Maryland Heights, v. 36, p. 443-459, 2006.

HAFEZ, E. S. E; HAFEZ, B. **Reprodução animal**. 7. ed. São Paulo: Manole, 2004. 513p

HYTTEL, P.; SINOWATZ, F.; VEJLSTED, M. Embriologia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2012. 472 p.

HOLDSWORTH, A.; BRADLEY, K.; BIRCH, S.; BROWNE, W. J, BARBERET, V. Elastography of the normal canine liver, spleen and kidneys. **Veterinary Radiology and Ultrasound**, v.55, p.620-62, 2014.

JAINUDEEN, M.R.; HAFEZ, E.S.E.; Gestation, prenatal physiology and parturition. In: HAFEZ, E.S.E.; HAFEZ, B. (Eds.), **Reproduction in Farm Animals**. 7^a ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. p. 140–155.

JOSHI, S.; KOTTECHA, S. Lung growth and development. **Early Human Development**, v.83, p.789–794, 2007.

KÄHN, W. **Veterinary Reproductive Ultrasonography**. London: Mosby-Wolf, 1994. p.187-205.

KOPELMAN, B.I; MIYOSHI, M.H; GUINSBURG, R. **Distúrbios respiratórios no período neonatal**. São Paulo: Atheneu, 1998.

KOTTECHA, S. Lung growth for beginners. **Pediatric Respiratory Reviews**, v.1, p.308–313, 2000.

LINTON, J.M.; MARTIN, G.R.; AND REICHARDT, L.F. The ECM protein nephronectin promotes kidney development via integrin alpha8beta1-mediated stimulation of Gdnf expression. **Development**, v.134, p.2501–2509, 2007.

LUZ, J.H. **Teste das microbolhas estáveis na avaliação da função surfatante in vitro** [dissertação]. Porto Alegre (RS): Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2001.

MARONEZI, M. C.; FELICIANO, M. A. R.; CRIVELLENTI, L. Z.; SIMÕES, A. P. R.; BARTLEWSKI, P. M.; GILL, I.; CANOLA, J. C.; VICENTE, W. R. R. Acoustic radiation force impulse elastography of the spleen in healthy dogs of different ages. **Journal of Small Animal Practice**, v.56, p.393-397, 2015.

MOEGLIN, D.; TALMANT, C.; DUyme, M.; LOPEZ, A.C. Fetal lung volumetry using two and three dimensional ultrasound. **Ultrasound in Obstetrics and Gynecology**, v.25, p.119-127, 2005.

NIGHTINGALE, K. Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Imaging: a Review. **Current Medical Imaging Reviews**, v.7, p.328-339, 2011.

NISSIM, S.; WEEKSB, O.; TALBOTD, J. C.; HEDGEPEETHB, J. W.; WUCHERPFENNIGB, J.; SCHATZMAN-BONEB, S.; SWINBURNEE, I.; CORTES, M.; ALEXAB, K.; MEGASONE, S.; NORTHF, T. E.; AMACHERD, S. L.; GOESSLING, W. Iterative use of nuclear receptor Nr5a2 regulates multiple stages of liver and pancreas development. *Developmental Biology*, v. 418, n.1, p.108–123, 2016

OLIVEIRA, M.E.F.; FELICIANO, M.A.R.; VICENTE, W.R.R. **Ultrassonografia do Sistema Reprodutor Feminino de Pequenos Ruminantes**. In: FELICIANO, M.A.R.; OLIVEIRA, M.E.F.; VICENTE, W.R.R. *Ultrassonografia na Reprodução*. São Paulo: Med Vet. 2014. p.121-140.

PERALTA, L.; MOURIER, E.; RICHARD, C.; CHARPIGN, G.; LARCHER, T.; AÏT-BELKACEM, D.; BALLA, N.K.; BRASSELET, S.; TANTER, M.; MULLER, M.; CHAVATTE-PALMER, P. In vivo evaluation of cervical stiffness evolution during induced ripening using shear wave elastography, histology and 2 photon excitation microscopy: insight from an animal model. **PLoS ONE**, v.10, n.8, p.1-21, 2015.

PRAKASH, K.N.B.; RAMAKRISHNAN, A.G.; SURESH, S.; CHOW, W.P. Fetal lung maturity analysis using ultrasound image features. **IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine**, v.6, p.38-45, 2002.

QUARELLO, E.; LACOSTE, R.; MANCINI, J.; MELOT—DUSSEAUD, S.; GORINCOUR, G. ShearWave elastography of fetal lungs in pregnant baboons. **Diagnostic and Interventional Imaging**, v.97, p.605—610, 2016.

QUARELLO, E.; LACOSTE, R.; MANCINI, J.; MELOT-DUSSEAU, S.; GORINCOUR, G. Shear waves elastography of the placenta in pregnant baboon. **Gynécologie Obstétrique & Fertilité**, v.43, p.200-204, 2015a.

QUARELLO, E.; LACOSTE, R.; MANCINI, J.; MELOT-DUSSEAU, S.; GORINCOUR, G. Feasibility and reproducibility of ShearWave (TM) elastography of fetal baboon organs. **Prenatal Diagnosis**, v.35, p.1112-1116, 2015b.

SCOTT, P.R., SARGISON, N.D. Ultrasonography as an adjunct to clinical examination in sheep. **Small Ruminant Research**, n. 92, p.108-119, 2010.

SIMÕES, A. P. R. **Ultrassonografia modo B e elastografia ARFI pulmonar e hepática fetal como método preditivo para a maturidade dos conceptos em fase final de gestação de cadelas**. 2016. 59f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária - Reprodução Animal) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Unesp, Câmpus de Jaboticabal, 2016.

SPENCER, T.E.; JOHNSON, G.A.; BAZER, F.W.; BURGHARDT, R.C. Implantation mechanisms: insights from the sheep. **Reproduction** v.128, p.657–668, 2004.

TABORDA, W.; ALENCAR JUNIOR, C.A.; BERTINI, A.M. **Avaliação da maturidade fetal**. In: BENZECRY, R.; OLIVEIRA, H.C.; LEMGRUBER, I. Tratado de obstetrícia. Rio de Janeiro: Revinter; 2000. p.873-85.

WHITE, I.R., RUSSEL, A.J., FOWLER, D.G. Real-time ultrasonic scanning in the diagnosis of pregnancy and the determination of fetal numbers in sheep. **Veterinary Research**, n.115, p.140–143, 1984.

1 **CAPITULO 2 - Elastografia Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) de tecidos** 2 **materno fetais em ovinos gestantes**

3 Priscila Del Aguila da Silva*, Ricardo Andrés Ramirez Uscategui[†], Victor José Correia
4 Santos*, Augusto Ryonosuke Taira*, Renata Sitta Gomes Mariano*, Mariana Garcia Kako
5 Rodrigues*, Ana Paula Rodrigues Simões*, Marjury Cristina Maronezi[†], Michelle Lopes
6 Avante[†], Wilter Ricardo Russiano Vicente*, Marcus Antonio Rossi Feliciano[¶]

7 *UNESP – Univ. Estadual Paulista, FCAV, *Departamento de Reprodução Animal. Via de acesso Prof. Paulo*
8 *Donato Castellane, s/n CEP: 14884-900, Jaboticabal, Sao Paulo, Brazil*

9 [†]UNESP – Univ. Estadual Paulista, FCAV, *Departamento de Clínica Cirúrgica. Via de acesso Prof. Paulo*
10 *Donato Castellane, s/n CEP: 14884-900, Jaboticabal, Sao Paulo, Brazil*

11 [¶]Corresponding author - e-mail: marcusfeliciano@yahoo.com.br. UNESP – Univ. Estadual Paulista, FCAV,
12 *Departamento de Reprodução Animal. Address: Via de acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n. Postal*
13 *Code: 14884-900, Jaboticabal, Sao Paulo, Brazil* Phone: +55 16 32092633

14 PALAVRAS-CHAVE: elastografia, gestação, desenvolvimento fetal, ultrassonografia

15 16 **RESUMO**

17 **Objetivos:** Avaliar a rigidez tecidual dos placentônios, pulmões, fígado e rins fetais, por
18 meio da elastografia acoustic radiation force impulse (ARFI), correlacionando os resultados
19 com o desenvolvimento gestacional de ovelhas.

20 **Métodos:** Vinte e quatro ovelhas gestantes foram incluídas no estudo. A rigidez tecidual de
21 placentônios, pulmão, fígado e rins fetais foi determinada semanalmente (totalizando 12
22 semanas de avaliação), desde a decima semana até a parição, por meio da elastografia ARFI
23 qualiquantitativa. As características da rigidez avaliadas pelo elastograma foram comparadas
24 qualitativamente entre os tecidos e os valores para velocidade de cisalhamento (m/s) dos
25 tecidos foram comparados entre as semanas gestacionais utilizando teste de Friedman e
26 correlacionada com modelos matemáticos de regressão.

27 **Resultados:** Ao elastograma, os tecidos avaliados não se apresentaram deformáveis, com
28 características de rigidez diferentes entre si (placentônio - cinza escuro; tecido renal - cinza
29 escuro e tonalidade abaixo do placentônio; fígado - cinza médio; e pulmão - cinza médio e
30 tonalidade abaixo do fígado). As velocidades de cisalhamento renal e do placentônio
31 apresentaram-se constantes durante o período gestacional ($P= 0,076$ e $0,34$, respectivamente),
32 enquanto que os valores desta variável para pulmão e fígado variaram ao longo da gestação
33 ($P < 0,001$) e foram estreitamente correlacionadas com a idade gestacional ($R^2 = 0,80$). A
34 velocidade de cisalhamento pulmonar decaiu gradativamente a partir da 16^a semana
35 gestacional enquanto a velocidade hepática aumentou a partir da 14^a semana atingindo o
36 máximo na última semana de gestação.

37 **Conclusões:** A elastografia ARFI demonstrou ser uma técnica prática e segura para a avaliação
38 do binômio materno-fetal, permitindo identificar os padrões de rigidez qualiquantitativos do
39 placentônio, pulmão, fígado e rim fetais; assim como acompanhar o desenvolvimento
40 gestacional das ovelhas por meio dos resultados da velocidade de cisalhamento dos tecidos
41 pulmonares e hepáticos. Sugere-se que este método pode ser utilizado para estudos
42 fisiológicos e patológicos na gestação de diversas espécies mamíferas.

INTRODUÇÃO

43

44 A elastografia é um método ultrassonográfico desenvolvido no início dos anos 90 por
45 Ophir et al.¹, que consiste na avaliação da elasticidade tecidual, permitindo uma “espécie de
46 palpação virtual”.^{2,3} Dentre as diferentes modalidades existentes, a técnica Acoustic
47 Radiation Force Impulse (ARFI) tem demonstrado relevante utilidade na avaliação de
48 neoplasias mamárias⁴ e afecções testiculares em cães⁵, com padronização de valores de
49 referência para a avaliação hepática, renal, esplênica, prostática e testicular em caninos
50 adultos^{6,7,8} e baço de gatos adultos.⁹

51 Recentemente esta ferramenta diagnóstica tornou-se objeto de diversas pesquisas na
52 área de ginecologia e obstetrícia. Em medicina, o estudo da elasticidade da cérvix em
53 mulheres caracterizou a rigidez deste tecido durante a gestação, tornando-se importante para
54 a avaliação da indução do parto das pacientes^{10,11}. Em ovelhas prenhes, verificou-se por meio
55 da elastografia “Shear Wave” que as estruturas da cérvix sofrem adaptações durante o
56 processo gestacional¹². Especificamente em tecidos fetais, dois estudos foram encontrados na
57 literatura, com babuínos como modelo experimental² e outro em fetos humanos,¹³ ambos
58 demonstrando a aplicabilidade e viabilidade da elastografia e sua correlação com o
59 desenvolvimento gestacional nestas espécies. Apesar dos estudos supracitados e da
60 aplicabilidade da ARFI em vários tecidos humanos e animais, este método diagnóstico ainda
61 não foi aprovado para uso em avaliações fetais pela Food and Drug Administration (FDA)².

62 A caracterização do desenvolvimento de tecidos materno-fetais é fundamental na
63 avaliação pré-natal das fêmeas gestantes, tanto para avaliar a viabilidade da gestação como
64 para estimar a idade gestacional ultrassonográfica¹⁴. Neste sentido, hipotetizamos que a
65 elastografia determina modificações na rigidez dos tecidos materno-fetais, durante a gestação,
66 permitindo estudar o desenvolvimento destes tecidos. Para tanto, objetiva-se avaliar a rigidez

67 tecidual dos placentônios, pulmões, fígado e rins fetais, por meio da elastografia ARFI,
68 correlacionando os resultados com o desenvolvimento gestacional normal de ovelhas.

69 MÉTODOS

70 Vinte e quatro ovelhas da raça Santa Inês, multíparas, com peso entre 40 e 60 quilos e
71 idade entre dois e cinco anos, foram selecionadas para este estudo após serem consideradas
72 híginas e sem histórico de doenças reprodutivas. Como exame prévio dos animais, foram
73 realizados exames físico, obstétrico e hemograma. Os animais são oriundos do Departamento
74 de Reprodução Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da
75 UNESP/Jaboticabal, Brasil, mantidos em aprisco de experimentação, alimentados com
76 silagem de milho, ração comercial balanceada, sal mineral e água *ad libitum*. O procedimento
77 experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (protocolo nº
78 10.387/16) da própria instituição.

79 Após seleção das fêmeas, os animais foram submetidos a um protocolo de
80 sincronização de estro: colocação de dispositivo intravaginal contendo 0,33 g de progesterona
81 (Eazi breed CIDR®, Pfizer, Nova Zelândia) no dia 0; aplicação de 37,5 µg de cloprostenol
82 (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos, SP, Brasil) e 300 UI de Gonadotrofina coriônica equina
83 (Novormon® Coopers MSD, Brasil) no 5º dia; e retirada do implante no 6º dia. Após 24
84 horas, estas fêmeas foram alocadas com dois reprodutores utilizando buçal marcador, para
85 facilitar a identificação dos animais cobertos, por um período de 72 horas. Vinte um dia após,
86 foi realizada avaliação ultrassonográfica transretal para diagnóstico gestacional, com o dia da
87 cobertura identificado mediante a marcação de tinta, considerado como o dia 0 da gestação.

88 Para as avaliações ultrassonográficas, os animais foram mantidos em posição
89 quadrupedal e com a cabeça voltada para o monitor. Antes dos exames, foi aplicado gel
90 específico para realização da ultrassonografia e o transdutor posicionado em região inguinal
91 direita.¹⁵

92 Utilizou-se aparelho ACUSON S2000 (SIEMENS, Munich, Germany) com software
93 para caracterização elastográfica quali-quantitativa (método ARFI - Virtual Touch Tissue
94 Quantification)¹⁶ e transdutor convexo, multifrequencial e matricial, de 4,5 MHz. A
95 realização dos exames ultrassonográficos ocorreu semanalmente, com início a partir da
96 décima (64 a 70 dias) semana gestacional (SG), estendendo-se até a última semana de
97 gestação (148 a 154 dias) das fêmeas.

98 Após localização das estruturas pulmonares, renais e hepática dos conceptos e
99 placentônios utilizando a ultrassonografia modo-B (cortes longitudinais e transversais),
100 utilizou-se a elastografia qualitativa para determinar o elastograma dos tecidos (avaliação da
101 rigidez tecidual relativa), obtendo-se imagens em tons de cinza: regiões claras (mais elástico -
102 menos rígido) e regiões escuras (menos elásticas - mais rígidas). Posteriormente, foram
103 determinados os valores médios para velocidade de cisalhamento (m/s) dos tecidos e a
104 profundidade destas avaliações, por meio da obtenção de três amostragens pela técnica ARFI
105 quantitativa.¹⁷

106 Para a análise estatística, utilizou-se software R-project (R Foundation for Statistical
107 Computing, Viena, Áustria). O delineamento experimental foi casualizado em blocos
108 (animais) e em parcelas subdivididas no tempo (semanas gestacionais). Previamente, foram
109 testadas a normalidade dos resíduos (teste Shapiro) e homocedasticidade das variâncias (teste
110 Barlett) de todas as análises quantitativas. A velocidade de cisalhamento dos diferentes
111 tecidos analisados foi comparada entre as semanas gestacionais pelo teste de Friedman; caso
112 o resultado deste teste resulta-se significativo, as medianas eram comparadas pelo pós-teste
113 de Dunns e comprovados os contrastes ortogonais (linear, quadrático ou cúbico). A relação
114 entre a velocidade e a profundidade da avaliação elastrográfica foi avaliada pelo teste de
115 correlação de Spearman. O nível de significância utilizado foi de 5% para todos os testes ($P <$
116 $0,05$) e os dados são apresentados como a mediana $\pm$ intervalo interquartil (IQR).

RESULTADOS

117

118 Todos os animais apresentaram processo gestacional normal, sem qualquer evidência
119 de anormalidades ou complicações ginecobstétricas. O tempo médio da gestação foi de $148 \pm$
120 1,8 dias, verificando-se 16 gestações simples, sete duplas e uma tripla. Nasceram 33 borregos
121 saudáveis e sem quaisquer sinais de anormalidades.

122 À elastografia qualitativa, os tecidos avaliados apresentaram-se não deformáveis e,
123 por meio do elastograma, as características da rigidez relativa permaneceram constantes,
124 quanto à escala de cinzas estudada. Ao comparar as imagens dos diferentes tecidos, verificou-
125 se a seguinte ordem decrescente de rigidez: placentônio (cinza escuro), tecido renal (cinza
126 escuro, tonalidade abaixo do observado no placentônio), fígado (cinza médio) e pulmão
127 (cinza médio, tonalidade abaixo do observado no fígado) (Figura 1).

128 Em relação à avaliação ARFI quantitativa (Figura 2), as velocidades de cisalhamento
129 do pulmão (VCpulm) e fígado (VCfig) fetais variaram ao longo das semanas gestacionais (P
130 $< 0,001$). A VCPulm decaiu a partir da 16ª semana, diminuindo gradativamente até a 21ª
131 semana gestacional. Este efeito pôde ser explicado pelo modelo matemático cúbico ($R^2 =$
132 0,80; Figura 3A):

$$VCpulm = 0,4 + 0,2 \times SG + 0,02 \times SG^2 + 0,0003SG^3$$

133 A VCfig apresentou aumento gradativo após a 14ª semana, atingindo seu valor
134 máximo na 21ª semana gestacional, sendo este efeito explicado pelo modelo matemático
135 linear ($R^2 = 0,80$; Figura 3B):

$$VCfig = 0,67 + 0,013 \times SG$$

136 As estruturas renais foram visibilizadas a partir da 11ª semana gestacional e suas
137 velocidades de cisalhamento (VCrim), assim como as dos placentônios (VCplac),
138 mantiveram-se constantes durante as semanas gestacionais avaliadas ($P = 0,076$ e $0,34$
139 respetivamente; Figura 3C e D). Ao correlacionar as velocidades obtidas com a profundidade

140 da avaliação e número de conceptos, não foram verificadas quaisquer influências destas
141 variáveis ($P > 0,05$). Na Tabela 1 encontram-se sumarizadas as variáveis elastográficas
142 quantitativas estudadas.

143 **DISCUSSÃO**

144 A avaliação elastográfica demonstrou-se aplicável, prática e de fácil execução, sem
145 quaisquer efeitos adversos observados para o binômio materno-fetal. Determinou-se a rigidez
146 dos placentônios, fígado, pulmões e rins fetais obtendo-se características quali-quantitativas a
147 partir da 10^a até a semana do parto. A elasticidade hepática e pulmonar dos conceptos
148 apresentaram modificações durante as semanas avaliadas e as velocidades de cisalhamento
149 (VCfig e VCpulm) correlacionaram-se com o desenvolvimento gestacional. Tais resultados
150 poderão ser utilizados como referencia para estudos fisiopatológicos na gestação de ovinos e
151 extrapolados para pesquisa em outras espécies.

152 As anormalidades no desenvolvimento pulmonar são uma das principais causas de
153 morbimortalidade neonatal em humanos e animais^{22,23,24}, sendo sua avaliação intrauterina um
154 desafio clínico, principalmente devido à eficácia questionável dos testes utilizados e
155 invasividade.^{25,26} O desenvolvimento de técnicas acuradas e não invasivas como a
156 elastografia podem incrementar positivamente o diagnóstico destas anormalidades.^{27,28} São
157 poucos os estudos que descrevem a utilização desta técnica na avaliação da rigidez pulmonar
158 fetal^{2,13} como fator indicativo de desenvolvimento. O presente estudo traz resultados
159 importantes sobre a rigidez pulmonar utilizando modelo experimental ovino, espécie que
160 compartilha características estruturais pulmonares com humanos (tamanho, fisiologia,
161 ramificação dicotômica das vias aéreas, microanatomia das vias aéreas periféricas e
162 desenvolvimento embrionário-fetal)^{29,30}, sugerindo que a elastografia ARFI permite
163 identificar o desenvolvimento intrauterino do pulmão fetal.

164 As modificações na rigidez pulmonar observadas estão relacionadas diretamente com
165 o desenvolvimento do tecido pulmonar na fase fetal.²⁰ Durante esta fase, espaços que
166 futuramente serão preenchidos com ar são repletos com líquido produzido pelo próprio órgão,
167 denominado de líquido pulmonar fetal, que os mantém distendidos, limitando a entrada de
168 líquido amniótico e permite o crescimento e maturação estrutural.^{31,32} Em ovinos, o volume
169 deste líquido aumenta progressivamente na segunda metade da gestação, atingindo o máximo
170 durante a última semana gestacional³³, corroborando com as modificações da rigidez
171 pulmonar observadas na elastografia.

172 O desenvolvimento da estrutura pulmonar divide-se em estágios embrionário,
173 pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar.¹⁸ Em humanos e ovinos, o pulmão inicia o
174 estágio alveolar aproximadamente quatro semanas antes do parto e se mantém até a vida
175 neonatal.^{30,33,34} Sendo a microestrutura similar nestas duas espécies, é consequente levantar a
176 hipótese que a modificação da rigidez tecidual pulmonar intrauterina em ovinos possa ser
177 uma variável estreitamente relacionada com o desenvolvimento deste órgão em humanos.

178 Estas alterações foram inicialmente descritas em estudo realizado em babuínos²,
179 observando-se correlação entre a elasticidade e idade gestacional, mediante modelos
180 matemáticos lineares ou quadráticos, entretanto com baixos coeficientes de determinação (R^2
181 $< 0,2$). Nossos resultados apresentam melhores indicativos de que a rigidez pulmonar
182 (VCpulm) correlaciona-se estreitamente com a idade gestacional, adaptando-se a um modelo
183 matemático cúbico ($R^2 = 0,80$), demonstrando que o pulmão fetal a partir da 16ª semana
184 gestacional torna-se cada vez menos rígido até o momento do parto. Estudo com fetos
185 humanos¹³ não demonstrou diferenças significativas para rigidez (VCpulm) durante o
186 segundo e terceiro trimestre gestacional, com valores maiores (0,94 – 1,08 m/s) que os
187 observados no presente estudo em ovinos (0,62 – 0,73 m/s).

188 Anomalias do desenvolvimento fetal podem afetar diretamente a estrutura hepática
189 dos neonatos³⁵, como a restrição de crescimento intrauterino (RCIU) e colestase
190 frequentemente observadas em humanos e associadas à natimortos e mortalidade
191 perinatal.^{36,37,38} A identificação destas anomalias na fase perinatal torna-se fundamental e
192 estudos recentes³⁹ indicam a elastografia como técnica promissora para estes pacientes.
193 Consideramos que os resultados obtidos no presente estudo, sobre a rigidez hepática fetal,
194 podem fornecer dados clinicamente relevantes para a avaliação do desenvolvimento
195 intrauterino deste tecido e favorecer a identificação de anormalidades que modificam sua
196 estrutura.

197 Durante a fase embrionária, o broto hepático é formado e representa o principal sítio
198 de hematopoese até o final da fase fetal, aproximadamente dois meses antes do parto em
199 humanos.^{19,40} Na fase fetal, as células hematopoiéticas migram da estrutura hepática para a
200 medula óssea, promovendo a organização do fígado e de sua função, o que o torna maduro.⁴¹
201 Estas modificações estruturais corroboram com o aumento gradativo da rigidez hepática
202 observada nos conceptos ovinos, demonstrando que as características elastográficas são
203 importante indicativo da transição estrutural hepática dos fetos.

204 Observou-se que a estrutura hepática fetal torna-se cada vez mais rígida
205 correlacionando-se positivamente com a idade gestacional em modelo linear ($R^2 = 0,80$).
206 Zheng et al.¹³ não observaram diferenças significativas na rigidez do fígado fetal humano
207 durante o segundo e terceiro trimestre gestacional, no entanto, os valores observados para
208 VCfig (0,98 m/s - 1,13 m/s) neste estudo apresentam um aumento similar ao que nós
209 observamos (0,79 - 0,96 m/s).

210 As estruturas renais e placentônios não apresentaram variações na rigidez tecidual
211 durante a gestação. Especificamente para os rins fetais, sugere-se que as mudanças estruturais
212 durante a gestação não promovem variações na elasticidade tecidual, detectáveis pela

213 elastografia. Com relação aos placentônios, estudos em bovinos demonstraram que esta
214 unidade apresenta conformação semelhante ao longo do processo gestacional (áreas
215 especializadas não glandulares e constituídas por tecido conjuntivo denso)²¹, corroborando
216 com os resultados constantes de rigidez. A avaliação placentária por meio da elastografia foi
217 validada por Quarello et al.⁴² em babuínos e Alan et al.⁴³ verificaram que na pré-eclâmpsia
218 em mulheres a rigidez deste tecido é elevada, o que demonstra que nossos resultados podem
219 contribuir para o estudo fisiopatológico destes tecidos.

220 Utilizando a elastografia qualitativa, verificou-se que os tecidos avaliados foram não
221 deformáveis e apresentam diferentes características de rigidez (elastograma), justificada pelas
222 suas composições teciduais.^{18,19,20,21} Estas particularidades na elasticidade corroboram a
223 importância do presente estudo ao determinar padrões diferenciais.

224 CONCLUSÃO

225 A elastografia ARFI demonstrou-se aplicável e segura na avaliação gestacional em
226 ovelhas, permitindo identificar as características quali-quantitativas da rigidez dos
227 placentônios, pulmão, fígado e rim fetais, assim como, demonstrar mudanças na elasticidade
228 dos tecidos pulmonar e hepático relacionadas com o desenvolvimento tecidual e idade
229 gestacional. Sugerimos que estes valores possam ser usados como referência para estudos
230 fisiológicos e patológicos em diversas espécies de mamíferos.

231 AGRADECIMENTOS

232 Agradecemos à FAPESP pelo auxílio pesquisa Jovem Pesquisador e bolsa Jovem
233 Pesquisador concedidos (processos 2012/16635-2; 2014/15117-3 e 2013/06443-1) e ao
234 CNPQ pela bolsa de mestrado concedida.

235 REFERÊNCIAS

236 1. Ophir J, Cespedes I, Ponnekanti H, Yazdi Y, Li X. Elastography: a quantitative method for
237 imaging the elasticity of biological tissues. *Ultrason imaging* 199; **13** : 111-134.

- 238 2. Quarello E, Lacoste R, Mancini J, Melot—Dusseaud S, Gorincour G. ShearWave
239 elastography of fetal lungs in pregnant baboons. *Diagn Interv Imaging* 2016; **97** : 605-610.
- 240 3. Fink M. Elastography: a new modality of ultrasound imaging. *Diagn Interv Imaging* 2013;
241 **94** : 485.
- 242 4. Feliciano MAR, Maronezi MC, Pavan L, Castanheira TL, Simões APR, Carvalho CF,
243 Canola JC, Vicente WRR. ARFI elastography as complementary diagnostic method of
244 mammary neoplasm in female dogs – preliminary results. *J Small Anim Pract* 2014; **55**:
245 504–508.
- 246 5. Feliciano MAR, Maronezi MC, Simões APR, Maciel GS, Pavan L, Gasser B, Silva P,
247 Uscategui RR, Carvalho CF, Canola JC, Vicente WRR. Acoustic radiation force impulse
248 (ARFI) elastography of testicular disorders in dogs: preliminary results. *Arq Bras Med Vet*
249 *Zootec* 2016; **68** : 283-291.
- 250 6. Holdsworth A, Bradley K, Birch S, Browne WJ, Barberet V. Elastography of the normal
251 canine liver, spleen and kidneys. *Vet Radiol Ultrasound* 2014; **55** : 620-662.
- 252 7. Feliciano MAR, Maronezi MC, Simões APR, Uscategui RR, Maciel GS, Carvalho CF,
253 Canola JC, Vicente WRR. Acoustic radiation force impulse elastography of prostate and
254 testes of healthy dogs: preliminary results. *J Small Anim Pract* 2015; **56** : 320-324.
- 255 8. Maronezi MC, Feliciano MAR, Crivellenti LZ, Simões APR, Bartlewski PM, Gill I,
256 Canola JC, Vicente WRR. Acoustic radiation force impulse elastography of the spleen in
257 healthy dogs of different ages. *J Small Anim Pract*, 2015; **56** : 393-397.
- 258 9. Feliciano MAR, Maronezi MC, Crivellenti LZ, Crivellenti SB, Simões APR, Brito MBS,
259 Garcia PHS, Vicente WRR. Acoustic radiation force impulse (ARFI) elastography of the
260 spleen in healthy adult cats – a preliminary study. *J Small Anim Pract* 2014; **56** : 180-183.

- 261 10. Hernandez-Andrade E, Hassan SS, Ahn H et al. Evaluation of cervical stiffness during
262 pregnancy using semiquantitative ultrasound elastography. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2013;
263 **41** : 152–161
- 264 11. Hwang HS, Sohn IS, Kwon HS. Imaging analysis of cervical elastography for prediction
265 of successful induction of labor at term. *J Ultrasound Med* 2013; **32** : 937–946.
- 266 12. Peralta L, Mourier E, Richard C, Charpign G, Larcher T, Aït-Belkacem D, Balla NK,
267 Brasselet S, Tanter M, Muller M, Chavatte-Palmer P. In vivo evaluation of cervical stiffness
268 evolution during induced ripening using shear wave elastography, histology and 2 photon
269 excitation microscopy: insight from an animal mode. *PLoS One* 2015; **10** : 101-21.
- 270 13. Zheng XZ, Wu J, Tan XY. A novel approach to assessing fetal tissue stiffness using
271 virtual touch tissue quantification. *Med Ultrason* 2016; **18** : 70-74.
- 272 14. Aissi A, Alloui N, Slimani C, Touri S. Preliminary study of the early ultrasonic diagnosis
273 of pregnancy and fetal development in the dog. *J Anim Vet Adv* 2008; **7** : 607-611.
- 274 15. Viñoles-Gil C, Gonzalez-Bulnes A, Martin GB, Zlatar FS, Sale S. Sheep and Goats. In
275 *Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography*, Descôteaux L,
276 Gnemmi G, Colloton J (eds). Willey-Blackwell: Iowa, 2010; 181-196.
- 277 16. Syversveen T, Brabrand K, Midtvedt K, Strom EH, Hartmann A, Jakobsen JA, Berstad
278 AE. Assessment of renal allograft fibrosis by acoustic radiation force impulse quantification
279 – a pilot study. *Transpl Int* 2011; **24** : 100-105.
- 280 17. Fierbinteanu-Braticевичi C, Andronescu D, Usvat R, Cretoiu D, Baicus C, Marinoschi G.
281 Acoustic radiation force imaging sonoelastography for noninvasive staging of liver fibrosis.
282 *World J Gastroenterol* 2009; **15** : 5525-5532.
- 283 18. Corrin B. The structure of the normal lungs. In *Pathology of the Lungs*, Churchill
284 Livingstone: London, 2010; 1-34.

- 285 19. Mcllin VA, Zorn AM. Molecular control of liver development. *Clin Liver Dis* 2006; **10** :
286 11-25.
- 287 20. Drozdowska J, Cousens C, Finlayson J, Collie D, Dagleish MP. Structural Development,
288 Cellular Differentiation and Proliferation of the Respiratory Epithelium in the Bovine Fetal
289 Lung. *J Comp Path* 2016; **154** : 42-56.
- 290 21. Björkman N. Morphological and histochemical studies on the bovine placenta. *Acta*
291 *Anatomica Suppl* 1954; **22** : 1-91.
- 292 22. Marin WB. Respiratory infections of sheep. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis* 1996;
293 **19** : 171-179.
- 294 23. Johnson CA. High-risk pregnancy and hypoluteoidism in the bitch. *Theriogenology* 2008;
295 **70** : 1424–1430.
- 296 24. Martin J, Fanaroff A. The preterm lung and airway: past, present, and future. *Pediatr*
297 *Neonatol* 2013; **54** : 228–234.
- 298 25. Prakash KNB, Ramakrishnan AG, Suresh S, Chow WP. Fetal lung maturity analysis
299 using ultrasound image features. *IEEE Trans Inf Technol Biomed* 2002; **6** : 38–45.
- 300 26. Varner S, Sherman G, Lewis D, Owens S, Bodie F, McCathran CE, Holliday N.
301 Amniocentesis for Fetal Lung Maturity: Will It Become Obsolete? *Rev Obstet Gynecol*. 2013;
302 **6** : 126-134.
- 303 27. Podobnik M, Brayer B, Ciglar S, Duić Z, Podgajski M. Ultrasonic fetal and placental
304 tissue characterization and lung maturity. *Int J Gynaecol Obstet* 1996; **54** : 221-229.
- 305 28. Kim SM, Park JS, Norwitz ER, Hwang EJ, Kang HS, Park CW, Jun JK. Acceleration
306 time-to-ejection time ratio in fetal pulmonary artery predicts the development of neonatal
307 respiratory distress syndrome: a prospective cohort study. *Am J Perinatal* 2013; **30** : 805-812.
- 308 29. Scheerlinck JP, Snibson KJ, Bowles VM, Sutton P. Biomedical applications of sheep
309 models: from asthma to vaccines. *Trends Biotechnol* 2008; **26** : 259–266

- 310 30. Martineau HM, Dagleish MP, Cousens C, Underwood C, Forbes V, Palmarini M,
311 Griffiths DJ. Cellular differentiation and proliferation in the ovine lung during gestation and
312 early postnatal development 2013; *J Comp Path*, **149** : 255-267.
- 313 31. Hooper SB, Harding R. Fetal lung liquid: A major determinant of the growth and
314 functional development of the fetal lung. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 1995; **22** : 235-247.
- 315 32. Harding R, Hooper SB. Regulation of lung expansion and lung growth before birth. *J*
316 *Appl Physiol* 1996; **81** : 209-224.
- 317 33. Alcorn DG, Adamson TM, Maloney JE, Robinson PM. A morphologic and morphometric
318 analysis of fetal lung development in the sheep. *Anat Rec* 1981; **201** : 655–667.
- 319 34. Burri PH. Structural aspects of postnatal lung development – alveolar formation and
320 growth. *Biol Neonate* 2006; **89** : 313–322.
- 321 35. Hassan GMA, Sliem HA, Ellethy AT. Hepatic Embryonic Development and Anomalies
322 of the Liver. *Journal of Gastroenterology and Hepatology Research* 2013; **2** : 489-493.
- 323 36. Jacobsson B, Ahlin K, Francis A, Hagberg G, Hagberg H, Gardosi J. Cerebral palsy and
324 restricted growth status at birth: population-based case-control study. *BJOG* 2008; **115** :
325 1250–1255.
- 326 37. Champion V, Carbajal R, Lozar J, Girard I, Mitanchez D. Risk factors for developing
327 transient neonatal cholestasis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2012; **55** : 592–598.
- 328 38. Jacquemin E, Lykavieris P, Chaoui N, Hadchouel M, Bernard O. Transient neonatal
329 cholestasis: origin and outcome. *J Pediatr* 1998; **133** : 563–567.
- 330 39. Alison M, Biran V, Tanase A, Bendavid M, Blouet M, Demené C, Sebagl G, Tanter M,
331 Baud O. Quantitative Shear-Wave Elastography of the Liver in Preterm Neonates with Intra-
332 Uterine Growth Restriction. *PLoS One* 2015; **10** : 1-14.
- 333 40. Zaret KS. Regulatory phases of early liver development: paradigms of organogenesis. *Nat*
334 *Rev Genet* 2002; **3** : 499-512.

- 335 41. Zhao R, Duncan SA. Embryonic Development of the Liver. *Hepatology* 2005; **41** : 956-
336 967.
- 337 42. Quarello E, Lacoste R, Mancini J, Melot-Dusseau S, Gorincour G. Shear waves
338 elastography of the placenta in pregnant baboon. *Gynecol Obstet Fertil* 2015; **43** : 200-204.
- 339 43. Alan B, Tunç S, Agacayak E, Bilici A. Diagnosis of pre-eclampsia and assessment of
340 severity through examination of the placenta with acoustic radiation force impulse
341 elastography. *J Gynaecol Obstet* 2016; **135** : 43-46.

351

352 **Figura 1:** Imagens elastográficas qualitativas de fetos ovinos, demonstrando o elastograma e
 353 tonalidades de cinza observadas nos tecidos fetais pulmonar (Lg), hepático (Lv), renal (Kd) e
 354 placentônio (Pl) durante a gestação das ovelhas.

355

356 **Figura 2:** Imagens elastográficas quantitativas de fetos ovinos, para obtenção das
 357 velocidades de cisalhamento e profundidade da avaliação, dos tecidos fetais pulmonar

358 (Lung), hepático (Liver), renal (Kidney) e placentônio (Placentome) durante a gestação das
 359 ovelhas.

360

361 **Figura 3:** Ilustração gráfica da velocidade de cisalhamento (VC m/s) dos tecidos materno
 362 fetais das ovelhas: A) pulmão; B) fígado; C) estrutura renal; e D) placentônio; avaliadas a
 363 partir da 10^a à 21^a semanal gestacional. Letras iguais indicam semelhança estatística ($p >$
 364 0,05) e as linhas vermelhas representam o modelo matemático que explica o comportamento
 365 da VC durante a gestação.

366 **Tabela 1.** Valores da mediana $\pm$ intervalo interquartil (IQR) e intervalo de confiança a 95% (IC95%) das velocidades de cisalhamento (SWV m/s) e profundidade de
 367 avaliação (Depth cm) do pulmão (Lung), fígado (Liver), rins (kidney) fetais e placentônio (Placentomes); avaliadas durante as semanas gestacionais 10 a 21 em ovelhas da
 368 raça santa Inês.

Variables	Gestational Weeks											
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lung SWV	0,70 $\pm$ 0,11	0,69 $\pm$ 0,19	0,71 $\pm$ 0,15	0,72 $\pm$ 0,17	0,69 $\pm$ 0,19	0,73 $\pm$ 0,20	0,64 $\pm$ 0,11	0,65 $\pm$ 0,10	0,64 $\pm$ 0,15	0,64 $\pm$ 0,11	0,64 $\pm$ 0,14	0,62 $\pm$ 0,12
CI95%	0,65-0,75	0,61-0,77	0,65-0,77	0,65-0,79	0,61-0,77	0,65-0,81	0,59-0,69	0,61-0,69	0,58-0,70	0,59-0,69	0,58-0,70	0,57-0,67
Depth	4,5 $\pm$ 3,0	5,5 $\pm$ 2,0	5,0 $\pm$ 2,7	5,4 $\pm$ 2,8	5,2 $\pm$ 1,5	5,4 $\pm$ 1,6	4,8 $\pm$ 2,1	5,9 $\pm$ 2,4	5,9 $\pm$ 2,2	6,0 $\pm$ 1,7	6,0 $\pm$ 1,6	6,4 $\pm$ 1,5
Liver SWV	0,79 $\pm$ 0,14	0,83 $\pm$ 0,18	0,83 $\pm$ 0,14	0,81 $\pm$ 0,16	0,88 $\pm$ 0,22	0,88 $\pm$ 0,18	0,92 $\pm$ 0,18	0,85 $\pm$ 0,17	0,89 $\pm$ 0,18	0,91 $\pm$ 0,18	0,90 $\pm$ 0,20	0,96 $\pm$ 0,28
CI95%	0,73-0,85	0,75-0,91	0,77-0,89	0,74-0,88	0,88-1,06	0,73-0,91	0,84-1,00	0,78-0,92	0,81-0,97	0,83-0,99	0,81-0,98	0,84-1,08
Depth	4,0 $\pm$ 2,6	5,3 $\pm$ 2,2	5,0 $\pm$ 1,9	6,1 $\pm$ 2,4	5,3 $\pm$ 2,1	5,3 $\pm$ 1,7	4,7 $\pm$ 2,1	5,6 $\pm$ 2,2	4,7 $\pm$ 2,5	5,6 $\pm$ 2,3	4,8 $\pm$ 3,3	5,2 $\pm$ 3,7
Kidney SWV	N/D	1,53 $\pm$ 0,25	1,31 $\pm$ 0,34	1,31 $\pm$ 0,41	1,26 $\pm$ 0,41	1,37 $\pm$ 0,54	1,28 $\pm$ 0,28	1,34 $\pm$ 0,35	1,29 $\pm$ 0,37	1,28 $\pm$ 0,38	1,34 $\pm$ 0,36	1,36 $\pm$ 0,37
CI95%	N/D	1,42-1,63	1,17-1,45	1,14-1,48	1,09-1,43	1,14-1,60	1,16-1,40	1,19-1,49	1,13-1,45	1,12-1,44	1,19-1,49	1,20-1,52
Depth	N/D	3,8 $\pm$ 2,2	4,5 $\pm$ 1,5	4,3 $\pm$ 2,8	4,6 $\pm$ 2,6	4,1 $\pm$ 2,1	3,5 $\pm$ 2,4	2,7 $\pm$ 1,5	2,7 $\pm$ 2,2	3,0 $\pm$ 1,2	3,0 $\pm$ 3,1	2,9 $\pm$ 0,9
Placentomes SWV	2,34 $\pm$ 0,56	2,25 $\pm$ 0,32	2,32 $\pm$ 0,57	2,34 $\pm$ 0,43	2,31 $\pm$ 0,46	2,34 $\pm$ 0,58	2,31 $\pm$ 0,51	2,36 $\pm$ 0,58	2,20 $\pm$ 0,51	2,21 $\pm$ 0,48	2,34 $\pm$ 0,59	2,28 $\pm$ 0,41
CI95%	2,10-2,58	2,11-2,38	2,08-2,56	2,16-2,52	2,12-2,50	2,09-2,58	1,91-2,34	2,11-2,60	1,98-2,41	2,01-2,41	2,09-2,59	2,11-2,45
Depth	4,0 $\pm$ 1,9	4,1 $\pm$ 1,9	3,5 $\pm$ 1,5	3,7 $\pm$ 2,4	3,0 $\pm$ 2,0	3,3 $\pm$ 1,9	3,0 $\pm$ 1,6	2,7 $\pm$ 1,9	2,7 $\pm$ 2,7	2,4 $\pm$ 1,4	2,6 $\pm$ 1,3	3,3 $\pm$ 2,2

369 N/D: Dados não disponíveis.